

# Konstantsete kordajatega DV erilahendi leidmine määramata kordajate meetodil

Vaatame konstantsete kordajatega lineaarset diferentsiaalvõrrandit

$$Ly = f,$$

see tähendab

$$p_0 y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = f(x). \quad (1)$$

Vastava lineaarse homogeense võrrandi  $Ly = 0$  lahendi leidmiseks on eeskiri olemas. Mittehomoogeense võrrandi lahendi  $y_*$  leidmiseks on lisaks Lagrange'i meetodile veel üks võimalus. Selleks on vaja määrata  $y_*$  kuju vabaliikmest  $f(x)$  lähtuvalt.

# Konstantsete kordajatega DV erilahendi leidmine määramata kordajate meetodil

Vaatame konstantsete kordajatega lineaarset diferentsiaalvõrrandit

$$Ly = f,$$

see tähendab

$$p_0 y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = f(x). \quad (1)$$

Vastava lineaarse homogeense võrrandi  $Ly = 0$  lahendi leidmiseks on eeskiri olemas. Mittehomoogeense võrrandi lahendi  $y_*$  leidmiseks on lisaks Lagrange'i meetodile veel üks võimalus. Selleks on vaja määrata  $y_*$  kuju vabaliikmest  $f(x)$  lähtuvalt.

# Konstantsete kordajatega DV erilahendi leidmine määramata kordajate meetodil

Vaatame konstantsete kordajatega lineaarset diferentsiaalvõrrandit

$$Ly = f,$$

see tähendab

$$p_0 y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = f(x). \quad (1)$$

Vastava lineaarse homogeenise võrrandi  $Ly = 0$  lahendi leidmiseks on eeskiri olemas. Mittehomogeenise võrrandi lahendi  $y_*$  leidmiseks on lisaks Lagrange'i meetodile veel üks võimalus. Selleks on vaja määrata  $y_*$  kuju vabaliikmest  $f(x)$  lähtuvalt.

# Konstantsete kordajatega DV erilahendi leidmine määramata kordajate meetodil

Vaatame konstantsete kordajatega lineaarset diferentsiaalvõrrandit

$$Ly = f,$$

see tähendab

$$p_0 y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = f(x). \quad (1)$$

Vastava lineaarse homogeense võrrandi  $Ly = 0$  lahendi leidmiseks on eeskiri olemas. Mittehomoogeense võrrandi lahendi  $y_*$  leidmiseks on lisaks Lagrange'i meetodile veel üks võimalus. Selleks on vaja määrata  $y_*$  kuju vabaliikmest  $f(x)$  lähtuvalt.

# Konstantsete kordajatega DV erilahendi leidmine määramata kordajate meetodil

Vaatame konstantsete kordajatega lineaarset diferentsiaalvõrrandit

$$Ly = f,$$

see tähendab

$$p_0 y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = f(x). \quad (1)$$

Vastava lineaarse homogeense võrrandi  $Ly = 0$  lahendi leidmiseks on eeskiri olemas. Mittehomoogeense võrrandi lahendi  $y_*$  leidmiseks on lisaks Lagrange'i meetodile veel üks võimalus. Selleks on vaja määrata  $y_*$  kuju vabaliikmest  $f(x)$  lähtuvalt.

## A Olgu võrrandi vabaliige $f(x)$ kujul

$$f(x) = e^{\alpha x} A_m(x) = e^{\alpha x} (a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m)$$

### Lause

*Kui arv  $\alpha$  ei ole lin. homogeenise võrrandi (1) karakteristliku võrrandi lahendiks, siis leidub võrrandil (1) üks lahend  $y_*(x)$  kujul*

$$y_*(x) = e^{\alpha x} P_m(x) = e^{\alpha x} (p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \dots + p_m),$$

*kus  $p_i$  on määramata kordajad.*

*Kui arv  $\alpha$  on  $s$ -kordne karakteristlik väärtus, siis võrrandil (1) leidub erilahend  $y_*$  kujul*

$$\begin{aligned} y_*(x) &= x^s e^{\alpha x} P_m(x) = \\ &= x^s e^{\alpha x} (p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \dots + p_m), \end{aligned}$$

*kus  $p_i$  on määramata kordajad.*

## A Olgu võrrandi vabaliige $f(x)$ kujul

$$f(x) = e^{\alpha x} A_m(x) = e^{\alpha x} (a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m)$$

### Lause

*Kui arv  $\alpha$  ei ole lin. homogeenise võrrandi (1) karakteristliku võrrandi lahendiks, siis leidub võrrandil (1) üks lahend  $y_*(x)$  kujul*

$$y_*(x) = e^{\alpha x} P_m(x) = e^{\alpha x} (p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \dots + p_m),$$

*kus  $p_i$  on määramata kordajad.*

*Kui arv  $\alpha$  on  $s$ -kordne karakteristlik väärtus, siis võrrandil (1) leidub erilahend  $y_*$  kujul*

$$\begin{aligned} y_*(x) &= x^s e^{\alpha x} P_m(x) = \\ &= x^s e^{\alpha x} (p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \dots + p_m), \end{aligned}$$

*kus  $p_i$  on määramata kordajad.*

## A Olgu võrrandi vabaliige $f(x)$ kujul

$$f(x) = e^{\alpha x} A_m(x) = e^{\alpha x} (a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m)$$

### Lause

*Kui arv  $\alpha$  ei ole lin. homogeense võrrandi (1) karakteristliku võrrandi lahendiks, siis leidub võrrandil (1) üks lahend  $y_*(x)$  kujul*

$$y_*(x) = e^{\alpha x} P_m(x) = e^{\alpha x} (p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \dots + p_m),$$

*kus  $p_i$  on määramata kordajad.*

*Kui arv  $\alpha$  on  $s$ -kordne karakteristlik väärtus, siis võrrandil (1) leidub erilahend  $y_*$  kujul*

$$\begin{aligned} y_*(x) &= x^s e^{\alpha x} P_m(x) = \\ &= x^s e^{\alpha x} (p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \dots + p_m), \end{aligned}$$

*kus  $p_i$  on määramata kordajad.*



## A Olgu võrrandi vabaliige $f(x)$ kujul

$$f(x) = e^{\alpha x} A_m(x) = e^{\alpha x} (a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m)$$

### Lause

*Kui arv  $\alpha$  ei ole lin. homogeenise võrrandi (1) karakteristliku võrrandi lahendiks, siis leidub võrrandil (1) üks lahend  $y_*(x)$  kujul*

$$y_*(x) = e^{\alpha x} P_m(x) = e^{\alpha x} (p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \dots + p_m),$$

*kus  $p_i$  on määramata kordajad.*

*Kui arv  $\alpha$  on  $s$ -kordne karakteristlik väärtus, siis võrrandil (1) leidub erilahend  $y_*$  kujul*

$$\begin{aligned} y_*(x) &= x^s e^{\alpha x} P_m(x) = \\ &= x^s e^{\alpha x} (p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \dots + p_m), \end{aligned}$$

*kus  $p_i$  on määramata kordajad.*

## B Olgu võrrandi vabaliige $f(x)$ kujul

$$f(x) = A_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + B_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

### Lause

*Kui  $\lambda = \alpha \pm \beta i$  ei ole võrrandi (1) karakteristikliku võrrandi lahendiks, siis leidub võrrandil (1) erilahend  $y_*(x)$  kujul*

$$y_*(x) = P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

*kus  $P_m, Q_n$  on sama astme polünoomid kui  $A_m, B_n$ .*

*Kui  $\lambda = \alpha \pm \beta i$  on  $s$ -kordne karakteristiklik väärtus, siis võrrandil (1) leidub lahend  $y_*$  kujul*

$$y_*(x) = x^s [P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x].$$

## B Olgu võrrandi vabaliige $f(x)$ kujul

$$f(x) = A_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + B_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

### Lause

*Kui  $\lambda = \alpha \pm \beta i$  ei ole võrrandi (1) karakteristikliku võrrandi lahendiks, siis leidub võrrandil (1) erilahend  $y_*(x)$  kujul*

$$y_*(x) = P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

*kus  $P_m, Q_n$  on sama astme polünoomid kui  $A_m, B_n$ .*

*Kui  $\lambda = \alpha \pm \beta i$  on  $s$ -kordne karakteristiklik väärtus, siis võrrandil (1) leidub lahend  $y_*$  kujul*

$$y_*(x) = x^s [P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x].$$

## B Olgu võrrandi vabaliige $f(x)$ kujul

$$f(x) = A_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + B_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

### Lause

*Kui  $\lambda = \alpha \pm \beta i$  ei ole võrrandi (1) karakteristikliku võrrandi lahendiks, siis leidub võrrandil (1) erilahend  $y_*(x)$  kujul*

$$y_*(x) = P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

*kus  $P_m, Q_n$  on sama astme polünoomid kui  $A_m, B_n$ .*

*Kui  $\lambda = \alpha \pm \beta i$  on  $s$ -kordne karakteristiklik väärtus, siis võrrandil (1) leidub lahend  $y_*$  kujul*

$$y_*(x) = x^s [P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_n(x)e^{\alpha x} \sin \beta x].$$

**C** Olgu  $Ly = f(x)$ , kus  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ .

Sellisel juhul leitakse võrrandi  $Ly = f_1(x)$  erilahend  $y_{*1}$  ning  $y_{*2}$ , mis on  $Ly = f_2(x)$  erilahendiks.

Võrrandi  $Ly = f(x)$  erilahendiks on

$$y_* = y_{*1} + y_{*2}.$$

**C** Olgu  $Ly = f(x)$ , kus  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ .

Sellisel juhul leitakse võrrandi  $Ly = f_1(x)$  erilahend  $y_{*1}$  ning  $y_{*2}$ , mis on  $Ly = f_2(x)$  erilahendiks.

Võrrandi  $Ly = f(x)$  erilahendiks on

$$y_* = y_{*1} + y_{*2}.$$

**C** Olgu  $Ly = f(x)$ , kus  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ .

Sellisel juhul leitakse võrrandi  $Ly = f_1(x)$  erilahend  $y_{*1}$  ning  $y_{*2}$ , mis on  $Ly = f_2(x)$  erilahendiks.

Võrrandi  $Ly = f(x)$  erilahendiks on

$$y_* = y_{*1} + y_{*2}.$$

**C** Olgu  $Ly = f(x)$ , kus  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ .

Sellisel juhul leitakse võrrandi  $Ly = f_1(x)$  erilahend  $y_{*1}$  ning  $y_{*2}$ , mis on  $Ly = f_2(x)$  erilahendiks.

Võrrandi  $Ly = f(x)$  erilahendiks on

$$y_* = y_{*1} + y_{*2}.$$



# Harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemid

Üldkuju:

$$\begin{cases} F_1(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \\ F_2(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \\ \dots \\ F_m(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Arvu  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_m$  nimetatakse süsteemi järguks.

Normaalkuju:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad (3)$$

# Harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemid

Üldkuju:

$$\begin{cases} F_1(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \\ F_2(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \\ \dots \\ F_m(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Arvu  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_m$  nimetatakse süsteemi järguks.

Normaalkuju:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad (3)$$

# Harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemid

Üldkuju:

$$\begin{cases} F_1(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \\ F_2(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \\ \dots \\ F_m(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Arvu  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_m$  nimetatakse süsteemi järguks.

Normaalkuju:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad (3)$$

# Harilike diferentsiaalvõrrandite süsteemid

Üldkuju:

$$\begin{cases} F_1(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \\ F_2(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \\ \dots \\ F_m(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{(n_1)}, y_2, y_2', \dots, y_2^{(n_2)}, \dots, y_m, y_m', \dots, y_m^{(n_m)}) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Arvu  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_m$  nimetatakse süsteemi järguks.

Normaalkuju:

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad (3)$$

## Teoreem

*Olgu funktsioonid  $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) pidevad muutujate  $x, y_1, y_2, \dots, y_n$  piirkonnas  $D$ . Siis läbi iga piirkonna  $D$  iga punkti  $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$  kulgeb vähemalt üks diferentsiaalvõrrandite süsteemi (2) integraalkõver.*

## Teoreem

*Olgu funktsioonid  $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) ja nende osatuletised  $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}$  ( $i, j = 1, 2, \dots, n$ ) määratud ja pidevad muutujate  $x, y_1, y_2, \dots, y_n$  piirkonnas  $D$ . Siis läbi iga piirkonna  $D$  iga punkti  $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$  kulgeb parajasti üks diferentsiaalvõrrandite süsteemi (2) integraalkõver.*

## Teoreem

*Olgu funktsioonid  $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) pidevad muutujate  $x, y_1, y_2, \dots, y_n$  piirkonnas  $D$ . Siis läbi iga piirkonna  $D$  iga punkti  $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$  kulgeb vähemalt üks diferentsiaalvõrrandite süsteemi (2) integraalkõver.*

## Teoreem

*Olgu funktsioonid  $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) ja nende osatuletised  $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}$  ( $i, j = 1, 2, \dots, n$ ) määratud ja pidevad muutujate  $x, y_1, y_2, \dots, y_n$  piirkonnas  $D$ . Siis läbi iga piirkonna  $D$  iga punkti  $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$  kulgeb parajasti üks diferentsiaalvõrrandite süsteemi (2) integraalkõver.*

## Teoreem

*Olgu funktsioonid  $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) pidevad muutujate  $x, y_1, y_2, \dots, y_n$  piirkonnas  $D$ . Siis läbi iga piirkonna  $D$  iga punkti  $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$  kulgeb vähemalt üks diferentsiaalvõrrandite süsteemi (2) integraalkõver.*

## Teoreem

*Olgu funktsioonid  $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) ja nende osatuletised  $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}$  ( $i, j = 1, 2, \dots, n$ ) määratud ja pidevad muutujate  $x, y_1, y_2, \dots, y_n$  piirkonnas  $D$ . Siis läbi iga piirkonna  $D$  iga punkti  $(x_0, y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0)$  kulgeb parajasti üks diferentsiaalvõrrandite süsteemi (2) integraalkõver.*

Üldlahend:

$$y_i = \varphi_i(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Konstantide väärtuste fikseerimisel saadavaid lahendeid nimetatakse erilahenditeks.



Üldlahend:

$$y_i = \varphi_i(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Konstantide väärtuste fikseerimisel saadavaid lahendeid nimetatakse erilahenditeks.

## Diferantsiaalvõrrandite süsteeme lahendatakse:

- 1) ühele kõrgemale võrrandile taandamise teel;
- 2) esimeste integraalide abil;
- 3) integreeruvate kombinatsioonide leidmise teel.

- Diferantsiaalvõrrandite süsteeme lahendatakse:
- 1) ühele kõrgemale võrrandile taandamise teel;
  - 2) esimeste integraalide abil;
  - 3) integreeruvate kombinatsioonide leidmise teel.

- Diferantsiaalvõrrandite süsteeme lahendatakse:
- 1) ühele kõrgemale võrrandile taandamise teel;
  - 2) esimeste integraalide abil;
  - 3) integreeruvate kombinatsioonide leidmise teel.

- Diferantsiaalvõrrandite süsteeme lahendatakse:
- 1) ühele kõrgemale võrrandile taandamise teel;
  - 2) esimeste integraalide abil;
  - 3) integreeruvate kombinatsioonide leidmise teel.

## Näide 1: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Esimese võrrandi diferentseerimisel saame

$$y'' = z'$$

ning asendades saadud tulemuse teise võrrandisse, saame

$$y'' = y.$$

Et  $y'' - y = 0$  on konstantsete kordajatega HDV, siis karakteristlik võrrand on

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

ning  $y_1 = e^x$  ja  $y_2 = e^{-x}$ .

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

## Näide 1: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Esimese võrrandi diferentseerimisel saame

$$y'' = z'$$

ning asendades saadud tulemuse teise võrrandisse, saame

$$y'' = y.$$

Et  $y'' - y = 0$  on konstantsete kordajatega HDV, siis karakteristlik võrrand on

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

ning  $y_1 = e^x$  ja  $y_2 = e^{-x}$ .

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

## Näide 1: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Esimese võrrandi diferentseerimisel saame

$$y'' = z'$$

ning asendades saadud tulemuse teise võrrandisse, saame

$$y'' = y.$$

Et  $y'' - y = 0$  on konstantsete kordajatega HDV, siis karakteristlik võrrand on

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

ning  $y_1 = e^x$  ja  $y_2 = e^{-x}$ .

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$



## Näide 1: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Esimese võrrandi diferentseerimisel saame

$$y'' = z'$$

ning asendades saadud tulemuse teise võrrandisse, saame

$$y'' = y.$$

Et  $y'' - y = 0$  on konstantsete kordajatega HDV, siis karakteristlik võrrand on

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

ning  $y_1 = e^x$  ja  $y_2 = e^{-x}$ .

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

## Näide 1: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Esimese võrrandi diferentseerimisel saame

$$y'' = z'$$

ning asendades saadud tulemuse teise võrrandisse, saame

$$y'' = y.$$

Et  $y'' - y = 0$  on konstantsete kordajatega HDV, siis karakteristlik võrrand on

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

ning  $y_1 = e^x$  ja  $y_2 = e^{-x}$ .

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

## Näide 1: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Esimese võrrandi diferentseerimisel saame

$$y'' = z'$$

ning asendades saadud tulemuse teise võrrandisse, saame

$$y'' = y.$$

Et  $y'' - y = 0$  on konstantsete kordajatega HDV, siis karakteristlik võrrand on

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

ning  $y_1 = e^x$  ja  $y_2 = e^{-x}$ .

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

## Näide 1: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Esimese võrrandi diferentseerimisel saame

$$y'' = z'$$

ning asendades saadud tulemuse teise võrrandisse, saame

$$y'' = y.$$

Et  $y'' - y = 0$  on konstantsete kordajatega HDV, siis karakteristlik võrrand on

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

ning  $y_1 = e^x$  ja  $y_2 = e^{-x}$ .

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

## Näide 1: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Esimese võrrandi diferentseerimisel saame

$$y'' = z'$$

ning asendades saadud tulemuse teise võrrandisse, saame

$$y'' = y.$$

Et  $y'' - y = 0$  on konstantsete kordajatega HDV, siis karakteristlik võrrand on

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

ning  $y_1 = e^x$  ja  $y_2 = e^{-x}$ .

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

$$z = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$$

Süsteemi lahendiks

$$\begin{cases} y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} \\ z = C_1 e^x - C_2 e^{-x} \end{cases}$$

Süsteemi lahendiks

$$z = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$$

$$\begin{cases} y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} \\ z = C_1 e^x - C_2 e^{-x} \end{cases}$$

## Definitsioon

*Piirkonnas  $D$  määratud mittekonstantset pidevalt diferentseeruvat funktsiooni*

$$\psi(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

*nimetatakse normaalkujulise süsteemi (4) esimeseks integraaliks, kui muutujate  $y_1, y_2, \dots, y_n$  asendamisel süsteemi (4) mistahes lahendiga  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$  muutub see funktsion konstantseks  $x$  suhtes:*

$$\psi(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)) \equiv C.$$

## Definitsioon

*Kui diferentsiaalvõrrandite süsteemi (4) esimesed integraalid  $\psi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) on sõltumatud, siis süsteemi (4) üldlahendiks ilmutamata kujul on*

$$\psi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$



## Definitsioon

Piirkonnas  $D$  määratud mittekonstantset pidevalt diferentseeruvat funktsiooni

$$\psi(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

nimetatakse normaalkujulise süsteemi (4) esimeseks integraaliks, kui muutujate  $y_1, y_2, \dots, y_n$  asendamisel süsteemi (4) mistahes lahendiga  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$  muutub see funktsion konstantseks  $x$  suhtes:

$$\psi(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)) \equiv C.$$

## Definitsioon

Kui diferentsiaalvõrrandite süsteemi (4) esimesed integraalid  $\psi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) on sõltumatud, siis süsteemi (4) üldlahendiks ilmutamata kujul on

$$\psi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

## Näide 2: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Lahendame süsteemi esimeste integraalide abil. Liidame süsteemi mõlemad võrrandid, saame

$$y' + z' = y + z,$$

siit

$$\frac{d(y + z)}{dx} = y + z$$

$$\frac{d(y + z)}{y + z} = dx$$

$$\ln |y + z| - x = C_1$$

Siit saame

$$\psi_1(x, y, z) = \ln |y + z| - x.$$

## Näide 2: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Lahendame süsteemi esimeste integraalide abil. Liidame süsteemi mõlemad võrrandid, saame

$$y' + z' = y + z,$$

siit

$$\frac{d(y + z)}{dx} = y + z$$

$$\frac{d(y + z)}{y + z} = dx$$

$$\ln |y + z| - x = C_1$$

Siit saame

$$\psi_1(x, y, z) = \ln |y + z| - x.$$

## Näide 2: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Lahendame süsteemi esimeste integraalide abil. Liidame süsteemi mõlemad võrrandid, saame

$$y' + z' = y + z,$$

siit

$$\frac{d(y + z)}{dx} = y + z$$

$$\frac{d(y + z)}{y + z} = dx$$

$$\ln |y + z| - x = C_1$$

Siit saame

$$\psi_1(x, y, z) = \ln |y + z| - x.$$

## Näide 2: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Lahendame süsteemi esimeste integraalide abil. Liidame süsteemi mõlemad võrrandid, saame

$$y' + z' = y + z,$$

siit

$$\frac{d(y + z)}{dx} = y + z$$

$$\frac{d(y + z)}{y + z} = dx$$

$$\ln |y + z| - x = C_1$$

Siit saame

$$\psi_1(x, y, z) = \ln |y + z| - x.$$

## Näide 2: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Lahendame süsteemi esimeste integraalide abil. Liidame süsteemi mõlemad võrrandid, saame

$$y' + z' = y + z,$$

siit

$$\frac{d(y + z)}{dx} = y + z$$

$$\frac{d(y + z)}{y + z} = dx$$

$$\ln |y + z| - x = C_1$$

Siit saame

$$\psi_1(x, y, z) = \ln |y + z| - x.$$

## Näide 2: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Lahendame süsteemi esimeste integraalide abil. Liidame süsteemi mõlemad võrrandid, saame

$$y' + z' = y + z,$$

siit

$$\frac{d(y + z)}{dx} = y + z$$

$$\frac{d(y + z)}{y + z} = dx$$

$$\ln |y + z| - x = C_1$$

Siit saame

$$\psi_1(x, y, z) = \ln |y + z| - x.$$

## Näide 2: Lahendada HDVS

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Lahendame süsteemi esimeste integraalide abil. Liidame süsteemi mõlemad võrrandid, saame

$$y' + z' = y + z,$$

siit

$$\frac{d(y + z)}{dx} = y + z$$

$$\frac{d(y + z)}{y + z} = dx$$

$$\ln |y + z| - x = C_1$$

Siit saame

$$\psi_1(x, y, z) = \ln |y + z| - x.$$



Teise esimese integraali leidmiseks lahutame süsteemi võrrandid, saame

$$y' - z' = z - y.$$

Sarnaselt eelneva lahenduskäiguga saame

$$\ln |y - z| + x = C_2$$

ja

$$\psi_2(x, y, z) = \ln |y - z| + x.$$

Kontrollime sõltumatust.

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{y+z} & \frac{1}{y+z} \\ \frac{1}{y-z} & \frac{-1}{y-z} \end{vmatrix} = -\frac{1}{y^2 - z^2} - \frac{1}{y^2 - z^2} = -\frac{2}{y^2 - z^2} \neq 0$$

Teise esimese integraali leidmiseks lahutame süsteemi võrrandid, saame

$$y' - z' = z - y.$$

Sarnaselt eelneva lahenduskaiguga saame

$$\ln |y - z| + x = C_2$$

ja

$$\psi_2(x, y, z) = \ln |y - z| + x.$$

Kontrollime sõltumatust.

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{y+z} & \frac{1}{y+z} \\ \frac{1}{y-z} & \frac{-1}{y-z} \end{vmatrix} = -\frac{1}{y^2 - z^2} - \frac{1}{y^2 - z^2} = -\frac{2}{y^2 - z^2} \neq 0$$

Teise esimese integraali leidmiseks lahutame süsteemi võrrandid, saame

$$y' - z' = z - y.$$

Sarnaselt eelneva lahenduskäiguga saame

$$\ln |y - z| + x = C_2$$

ja

$$\psi_2(x, y, z) = \ln |y - z| + x.$$

Kontrollime sõltumatust.

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{y+z} & \frac{1}{y+z} \\ \frac{1}{y-z} & \frac{-1}{y-z} \end{vmatrix} = -\frac{1}{y^2 - z^2} - \frac{1}{y^2 - z^2} = -\frac{2}{y^2 - z^2} \neq 0$$

Teise esimese integraali leidmiseks lahutame süsteemi võrrandid, saame

$$y' - z' = z - y.$$

Sarnaselt eelneva lahenduskäiguga saame

$$\ln |y - z| + x = C_2$$

ja

$$\psi_2(x, y, z) = \ln |y - z| + x.$$

Kontrollime sõltumatust.

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{y+z} & \frac{1}{y+z} \\ \frac{1}{y-z} & \frac{-1}{y-z} \end{vmatrix} = -\frac{1}{y^2 - z^2} - \frac{1}{y^2 - z^2} = -\frac{2}{y^2 - z^2} \neq 0$$

Teise esimese integraali leidmiseks lahutame süsteemi võrrandid, saame

$$y' - z' = z - y.$$

Sarnaselt eelneva lahenduskäiguga saame

$$\ln |y - z| + x = C_2$$

ja

$$\psi_2(x, y, z) = \ln |y - z| + x.$$

Kontrollime sõltumatust.

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{y+z} & \frac{1}{y+z} \\ \frac{1}{y-z} & \frac{-1}{y-z} \end{vmatrix} = -\frac{1}{y^2 - z^2} - \frac{1}{y^2 - z^2} = -\frac{2}{y^2 - z^2} \neq 0$$

Teise esimese integraali leidmiseks lahutame süsteemi võrrandid, saame

$$y' - z' = z - y.$$

Sarnaselt eelneva lahenduskäiguga saame

$$\ln |y - z| + x = C_2$$

ja

$$\psi_2(x, y, z) = \ln |y - z| + x.$$

Kontrollime sõltumatust.

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{y+z} & \frac{1}{y+z} \\ \frac{1}{y-z} & \frac{-1}{y-z} \end{vmatrix} = -\frac{1}{y^2 - z^2} - \frac{1}{y^2 - z^2} = -\frac{2}{y^2 - z^2} \neq 0$$

Teise esimese integraali leidmiseks lahutame süsteemi võrrandid, saame

$$y' - z' = z - y.$$

Sarnaselt eelneva lahenduskäiguga saame

$$\ln |y - z| + x = C_2$$

ja

$$\psi_2(x, y, z) = \ln |y - z| + x.$$

Kontrollime sõltumatust.

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{y+z} & \frac{1}{y+z} \\ \frac{1}{y-z} & \frac{-1}{y-z} \end{vmatrix} = -\frac{1}{y^2 - z^2} - \frac{1}{y^2 - z^2} = -\frac{2}{y^2 - z^2} \neq 0$$

Leitud kahest sõltumatust esimesest integraalist saame leida süsteemi lahendid ilmutatud kujul. Selleks saame

$$\begin{cases} \ln |y + z| - x = C_1 \\ \ln |y - z| + x = C_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y + z = C_3 e^x \\ y - z = C_4 e^{-x} \end{cases}$$

Siit

$$\begin{cases} y = 0,5(C_3 e^x + C_4 e^{-x}) \\ z = 0,5(C_3 e^x - C_4 e^{-x}) \end{cases}$$



Leitud kahest sõltumatust esimesest integraalist saame leida süsteemi lahendid ilmutatud kujul. Selleks saame

$$\begin{cases} \ln |y + z| - x = C_1 \\ \ln |y - z| + x = C_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y + z = C_3 e^x \\ y - z = C_4 e^{-x} \end{cases}$$

Siit

$$\begin{cases} y = 0,5(C_3 e^x + C_4 e^{-x}) \\ z = 0,5(C_3 e^x - C_4 e^{-x}) \end{cases}$$

Leitud kahest sõltumatust esimesest integraalist saame leida süsteemi lahendid ilmutatud kujul. Selleks saame

$$\begin{cases} \ln |y + z| - x = C_1 \\ \ln |y - z| + x = C_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y + z = C_3 e^x \\ y - z = C_4 e^{-x} \end{cases}$$

Siit

$$\begin{cases} y = 0,5(C_3 e^x + C_4 e^{-x}) \\ z = 0,5(C_3 e^x - C_4 e^{-x}) \end{cases}$$